

## 臨床検査基準値一覧

[血液検査](#)

[凝固・線溶検査](#)

[尿検査](#)

[生化学検査](#)

[免疫血清検査](#)

[腫瘍マーカー検査](#)

[ホルモン検査](#)

[血中薬物濃度検査](#)

2020年6月版

国立がん研究センター  
中央病院

臨床検査科

検査項目	略語	基準範囲			
		男性	女性	単位	
血球算定検査	白血球数	WBC	3.3~8.6		10 <sup>3</sup> /μL
	赤血球数	RBC	435~555	386~492	10 <sup>4</sup> /μL
	ヘモグロビン濃度（血色素濃度）	Hgb	13.7~16.8	11.6~14.8	g/dL
	ヘマトクリット値	Ht	40.7~50.1	35.1~44.4	%
	平均赤血球容積	MCV	83.6~98.2		fL
	平均赤血球ヘモグロビン量	MCH	27.5~33.2		pg
	平均赤血球ヘモグロビン濃度	MCHC	31.7~35.3		g/dL
	血小板数	PLAT	15.8~34.8		10 <sup>4</sup> /μL
	網状赤血球	RET	3.6~20.6	3.6~22.0	‰
末梢血液像検査	好塩基球	Baso	0.0~5.0	0.0~3.0	%
	好酸球	Eos	0.0~10.0	0.0~5.0	%
	杆状核球	Stab	1.1~8.9	0.9~6.5	%
	分節核球	Seg	44.1~59.9	48.8~66.2	%
	好中球	Neut	45.2~68.8	49.7~72.7	%
	リンパ球	Lymp	26.8~43.8	24.5~38.9	%
	単球	Mono	2.7~7.9	1.7~8.7	%

検査項目	略語	基準範囲			
		男性	女性	単位	
凝固・線溶検査他	Dダイマー	D-D	1.0 未満		μg/mL
	フィブリノーゲン/フィブリン分解産物	FDP	5.0 未満		μg/mL
	フィブリノーゲン	FIBG	150~400		mg/dL
	アンチトロンビンⅢ	ATⅢ	80~140		%
	活性化部分トロンボプラスチン時間	APTT	23~40		秒
	プロトロンビン時間	PT %	70~140		%
		PT 秒	9.0~13.0		秒
PT- INR		0.80~1.20			
赤沈	赤血球沈降速度	赤沈	2~10	3~15	mm/1h

検査項目		略語	基準範囲		
			男性	女性	単位
尿 定 性 検 査	比重		1.006~1.022		
	pH		4.6~7.5		
	蛋白		(-)		
	糖		(-)		
	ウロビリノーゲン		n		
	潜血		(-)		
	ビリルビン		(-)		
	ケトン体		(-)		
	亜硝酸塩		(-)		
	白血球 (エステラーゼ)		(-)		
	妊娠反応 (hCG 定性)		(-)		感度 : 25mIU/mL
	微量アルブミン		(-)		

	検査項目	略語	基準範囲		
			男性	女性	単位
尿 定 量 検 査	尿浸透圧	U osm	50～1,300		mOsm/Kg H <sub>2</sub> O
	尿糖(蓄尿)	U-GLU-D	40～85		mg/day
	尿蛋白(蓄尿)	U-TP-D	20～120		mg/day
	ナトリウム(蓄尿)	U-Na-D	150～250		mmol/L/day
	カリウム(蓄尿)	U-K-D	50～100		mmol/L/day
	クロール(蓄尿)	U-CL-D	70～250		mmol/L/day
	無機リン(蓄尿)	U-IP-D	400～800		mg/day
	尿酸(蓄尿)	U-UA-D	0.4～0.8		g/day
	クレアチニン(蓄尿)	U-CRE-D	0.5～1.5		g/day
	カルシウム(蓄尿)	U-Ca-D	100～200		mg/day
	マグネシウム(蓄尿)	U-Mg-D	20.6～164.9		mg/day
	尿素窒素(蓄尿)	U-UN-D	6.5～13.0		g/day

検査項目	略語	基準範囲			
		男性	女性	単位	
生 化 学 検 査	総蛋白	TP	6.6~8.1		g/d L
	アルブミン	ALB	4.1~5.1		g/d L
	総ビリルビン	T-Bil	0.4~1.5		mg/d L
	直接ビリルビン	D-Bil	0.3 以下		mg/d L
	胆汁酸	TBA	10.0 以下		$\mu$ mol/L
	インドシアニングリーン試験	ICG15'	10 以下		%
	総コレステロール	TC	142~248		mg/d L
	HDL コレステロール	HDL-C	38~90	48~103	mg/d L
	LDL コレステロール	LDL-C	65~163		mg/d L
	中性脂肪	TG	40~234	30~117	mg/d L
	ヘモグロビン A1c	HbA1c	4.6~6.2 (NGSP 値)		%
	血漿グルコース (血糖)	GLU (血漿)	73~109		mg/d L
	血清グルコース (血糖)	GLU (血清)	73~109		mg/d L
	グリコアルブミン	GA	11~16		%
	ナトリウム	Na	138~145		mmol/L
	カリウム	K	3.6~4.8		mmol/L
	クロール	Cl	101~108		mmol/L
	カルシウム	Ca	8.8~10.1		mg/d L
	無機リン	IP	2.7~4.6		mg/d L
	血清浸透圧	P osm	275~290		mOsm/Kg H <sub>2</sub> O
アンモニア	NH <sub>3</sub>	12~66		$\mu$ g/d L	

検査項目	略語	基準範囲			
		男性	女性	単位	
生 化 学 検 査	血清鉄	Fe	40~188		μg/dL
	総鉄結合能	TIBC	253~365	246~410	μg/dL
	不飽和鉄結合能	UIBC	170~250	180~270	μg/dL
	マグネシウム	Mg	1.8~2.4		mg/dL
	亜鉛	Zn	80~130		μg/dL
	血清アミラーゼ	血清-AMY	44~132		U/L
	尿中アミラーゼ	尿-AMY	700 未満		U/L
	アルカリフォスファターゼ	ALP	106~322		U/L
	AST (GOT)	AST(GOT)	13~30		U/L
	ALT (GPT)	ALT(GPT)	10~42	7~23	U/L
	乳酸脱水素酵素	LD	124~222		U/L
	γ-GT	γ-GTP	13~64	9~32	U/L
	ロイシンアミノペプチターゼ	LAP	30~70		U/L
	コリンエステラーゼ	ChE	240~486	201~421	U/L
	クレアチンキナーゼ	CK	59~248	41~153	U/L
	クレアチンキナーゼ MB	CKMB	6.6 以下		ng/mL
	尿酸	UA	3.7~7.8	2.6~5.5	mg/dL
	クレアチニン	CRE	0.65~1.07	0.46~0.79	mg/dL
	尿素窒素	BUN	8~20		mg/dL
	β2-マイクログロブリン	β2-MG	0.8~2.0		mg/L
尿中β2-マイクログロブリン	U-β2MG	30~340		μg/L	

	検査項目	略語	基準範囲		
			男性	女性	単位
生化学検査	プレアルブミン	PreAlb	22~40		mg/dL
	ハプトグロビン	Hpt	19~170		mg/dL
	C-反応性蛋白	CRP	0.14 以下		mg/dL
	免疫グロブリンG	IgG	861~1747		mg/dL
	免疫グロブリンA	IgA	93~393		mg/dL
	免疫グロブリンM	IgM	33~183	50~269	mg/dL
	心筋トロポニン I	TnI	0.03 以下		ng/mL
	脳性ナトリウム利尿ペプチド	BNP	18.4 以下		pg/mL
	リパーゼ	Lipase	13~55		U/L
血液ガス	水素イオン濃度指数	pH	7.350~7.450		
	酸素分圧	PaO2	75.0~100.0		mmHg
	炭酸ガス分圧	PaCO2	35.0~45.0		mmHg
	重炭酸イオン	HCO3 <sup>-</sup>	20.0~26.0		mmol/L
	塩基余剰	BE	-3.0~3.0		mmol/L
	乳酸	Lac	0.5~1.6		mmol/L
	酸素飽和度	SAT	92.0~98.5		%

検査項目	略語	基準範囲		
		男性	女性	単位
感染症・自己抗体検査	梅毒脂質抗体	RPR	(-)	
	梅毒トレポネーマ抗体	TP 抗体	(-) 0.5 未満	
	B型肝炎ウイルス表面抗原	HBs Ag	(-) 0.05 未満	
	B型肝炎ウイルス表面抗体	HBs Ab	(-) 10.0 未満	
	B型肝炎ウイルスコア抗体	HBc Ab	(-) 1.0 未満	
	B型肝炎ウイルス核酸定量	HBV-DNA	検出せず	
	C型肝炎ウイルス抗体	HCV Ab	(-) 1.0 未満	
	ヒト免疫不全ウイルス (Ip24 抗原・HIV 抗体)	HIVAg/Ab	(-) 1.0 未満	
	成人T細胞白血病ウイルス (HTLV) 抗体	HTLV-I	(-) 1.0 未満	
	$\beta$ -D グルカン	$\beta$ -D グルカン	11.0 未満	
	プロカルシトニン	PCT	0.05 未満	
	尿素呼気検査	UBT	(-)	

	検査項目	略語	基準範囲		
			男性	女性	単位
腫瘍マーカー検査	αフェトプロテイン	AFP	10.0 以下		ng/mL
	癌胎児性抗原	CEA	5.0 以下		ng/mL
	フェリチン	FER	25~280	10~120	ng/mL
	糖鎖抗原 19-9	CA19-9	37.0 以下		U/mL
	糖鎖抗原 15-3	CA15-3	28 以下		U/mL
	糖鎖抗原 125	CA125	35.0 以下		U/mL
	ヒト精巣上体タンパク 4	HE4	—	閉経前 70 以下 閉経後 140 以下	pmol/L
	卵巣悪性腫瘍推定値	ROMA 値		閉経前 7.4 未満 閉経後 25.3 未満	%
	可溶性インターロイキン 2 レセプター	sIL-2R	122~496		U/mL
	エラスターゼ 1	IRE	300 以下		ng/dL
	神経特異エノラーゼ	NSE	15.0 以下		ng/mL
	扁平上皮癌関連抗原	SCC	1.5 以下		ng/mL
	前立腺特異抗原	PSA	2.700 以下		ng/mL
	NCC-ST-439	NCC-ST-439	4.5 未満	49才以下 7.0 未満 50才以上 4.5 未満	U/mL
	ビタミン K 欠乏性蛋白-II	PIVKA-II	40 未満		mAU/mL
	サイトケラチン 19 フラグメント(シフラ)	CYFRA	2.2 以下		ng/mL
	ガストリン放出ペプチド前駆体	ProGRP	81.0 未満		pg/mL

略語			基準範囲		
			男性	女性	単位
血清蛋白分画	アルブミン分画	ALB	57.1~67.8		%
	$\alpha$ 1-グロブリン分画	$\alpha$ 1-gl	1.6~2.7		%
	$\alpha$ 2-グロブリン分画	$\alpha$ 2-gl	6.6~11.0		%
	$\beta$ -グロブリン分画	$\beta$ -gl	8.5~13.2		%
	$\gamma$ -グロブリン分画	$\gamma$ -gl	11.5~22.4		%
	アルブミン/グロブリン比	A/G	1.30~2.20		
蛋白関連検査	シアリル化糖鎖抗原 KL-6	KL-6	500 未満		U/mL

検査項目		略語	基準範囲		
			男性	女性	単位
ホル モ ン 検 査	黄体形成ホルモン	LH	0.57~12.07	卵胞期 1.80~11.78	mIU/mL
				排卵期 7.59~89.08	
				黄体期 0.56~14.00	
				閉経期 5.16~61.99	
	卵胞刺激ホルモン	FSH	0.95~11.95	卵胞期 3.03~8.08	mIU/mL
				排卵期 2.55~16.69	
				黄体期 1.38~5.47	
				閉経期 26.72~133.41	
	甲状腺刺激ホルモン	TSH	0.35~4.94		μ IU/mL
	遊離型トリヨードサイロニン	FT3	1.88~3.18		pg/mL
遊離型サイロキシシン	FT4	0.70~1.48		ng/dL	
インスリン	IRI	2.7~10.4		μ U/mL	
ヒト絨毛性ゴナドトロピン	HCG	2.0 以下	3.0 以下	mIU/mL	
エストラジオール	E2	19.0~51.0	卵胞期 19.0~226.0	pg/mL	
			排卵期 49.0~487.0		
			黄体期 78.0~252.0		
			閉経期 39.0 以下		

	副腎皮質刺激ホルモン	ACTH	7.2~63.3	午前 7 時~10 時	pg/mL
	コルチゾール	—	7.07~19.60	午前 6 時~10 時	μ g/dL

検査項目		有効血中濃度	単位
血 中 薬 物 濃 度 検 査	メトトレキサート	24 時間後 10 以下 48 時間後 1.0 以下 72 時間後 0.1 以下	μ mol/L
	シクロスポリン	持続投与 250~400 経口投与 150~250	ng/mL
	タクロリムス	持続投与 10~15 経口投与 5~10	ng/mL
	バンコマイシン	ピーク値 25~40 トラフ値 10~15	μ g/mL
	フェニトイン	10.0~20.0	μ g/mL
	バルプロ酸ナトリウム	50~100	μ g/mL
	テイコプラニン	トラフ値 20~30	μ g/mL