



便秘

□ 患者が感じる不便さには

「便秘と下痢を繰り返す」
 「便がコンクリートのように硬くなつた」
 などがあります

□ 原因

症状を和らげる薬の副作用

吐気止め、医療用麻薬、一部の抗うつ薬などは、腸の動きを抑えるため、便秘になりやすくなります。

抗がん剤の副作用

ビンクリスチン（オンコビン）

パクリタキセル（タキソール）などは、自律神経に影響して、便秘が起こることがあります。

がんの症状によるもの

腹部の手術後、がんの病状なども便秘の原因になります。

生活習慣に関連したもの

腹部の手術後、運動量の不足、精神的ストレス、食事や水分摂取量の減少、カルシウムやカリウムのバランス異常なども原因になります。

□ 生活の工夫

・食事や水分のとり方を工夫してみましょう。

汁物や果物を加えたり、水分を多めにとりましょう。便が硬くなりやすい食品（白米、白パン、おもち、うどんなど）をとりすぎないようにしましょう。

豆類、乾物など食物纖維の多い食品がおすすめです。

ヨーグルト、漬物、納豆などの発酵食品をとって、善玉菌を増やしましょう。

・適度な運動をしましょう。

散歩や軽い体操などでからだを動かしてみましょう。

・我慢しないでトイレに行きましょう。

我慢を繰り返すと便秘になりやすくなります。朝食の後、落ち着いてトイレに座ってみましょう。

・からだを温めてみましょう。

・マッサージも試してみましょう。

おへその周りを時計回りに、手で何回も「の」の字をかくようにゆっくりマッサージしてみましょう。