食道癌 ドセタキセル						インターバル
ドセタキセル	70	mg/m ²	1時間	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】なし						

食道癌 5FU持続						インターバル
フルオロウラシル	250	mg/ m i̇́	24時間	持続	(Day 1-5)	7日
【前投薬】なし						

食道癌 DCF(biweekly)						インターバル
ドセタキセル	30-40	${\rm mg/m}^2$	1時間	点静	(Day 1,15)	
シスプラチン	80	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	28日
フルオロウラシル	800	mg/m^2	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 DCF70/70/750	インターバル					
ドセタキセル	70	${\rm mg/m}^2$	1時間	点静	(Day 1)	
シスプラチン	70	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	21日
フルオロウラシル	750	mg/m^2	24時間	持続	(Day 1-5)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP700/70						インターバル
フルオロウラシル	700	mg/m^2	24時間	点静	(Day 1-4)	28日
シスプラチン	70	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)	2011
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP800/80						インターバル
フルオロウラシル	800	${\rm mg/m}^2$	24時間	点静	(Day 1-5)	21日
シスプラチン	80	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	2111
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FP1000/75						インターバル
フルオロウラシル	1,000	${\rm mg/m}^2$	24時間	点静	(Day 1-4)	28日
シスプラチン	75	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	2011
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 Tisle+FP800/800	インターバル					
チスレリズマブ	200	mg/body	1時間	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	800	mg/m^2	24時間	点静	(Day 1-5)	21日
シスプラチン	80	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 Tisle+FP800/80	インターバル					
チスレリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	800	mg/m^2	24時間	点静	(Day 1-5)	21日
シスプラチン	80	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】 ・アプレピタントセット						

食道癌 FOLFOX6						インターバル
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)	174
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】なし						

食道癌 FOLFOX6 アレルギー							
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)		
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日	
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)	174	
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)		
【前投薬】なし							

食道癌 RT+FOLFOX6	(1600)					インターバル
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	1,600	mg/m^2	46時間	点静	(Day 1)	
【前投薬】なし						

食道癌 RT+FOLFOX6(1600) アレルギー							
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)		
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日	
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	1,600	mg/m^2	46時間	点静	(Day 1)		
【前投薬】なし							

食道癌 Ipi+Nivo						インターバル
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1,15,29)	42日
イピリムマブ	1	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	72 🖂
【前投薬】なし					•	

食道癌 Nedaplatin+5FU							
フルオロウラシル	800	${\rm mg/m}^2$	24時間	点静	(Day 1-5)	28日	
ネダプラチン	90	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	20口	
【前投薬】なし							

食道癌 Nivo					インターバル
ニボルマブ	240 mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】なし					

食道癌(4週)Nivolumab	インターバル					
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】なし						

食道癌 Nivo+FP800							
ニボルマブ	480	mg/body	30分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	800	mg/m^2	24時間	点静	(Day 1-5)	28日	
シスプラチン	80	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)		
【前投薬】 ・アプレピタントセット							

食道癌 Nivo+FOLFOX6							
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)		
オキサリプラチン	85	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)		
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日	
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)		
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)		
【前投薬】なし							

食道癌 Nivo+FOLFOX6 アレルギー								
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)			
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)			
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日		
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)			
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)			
【前投薬】なし								

食道癌Pembro+FP800/80							
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)		
シスプラチン	80	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)	21日	
フルオロウラシル	800	${\rm mg/m}^2$	24時間	持続	(Day 1-5)		
【前投薬】 ・アプレピタントセット							

食道癌 Pembrolizumab						インターバル
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
【前投薬】なし						

食道癌 Weekly PTX(80	インターバル					
パクリタキセル	80	mg/m^2	1時間	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	49日
【前投薬】なし						

食道癌 Weekly PTX(100mg/m²)						
パクリタキセル	100	mg/m^2	1時間	点静	(Day 1,8,15,22,29,36)	49日
【前投薬】	•		•	•	•	
なし						