卵巣癌 CBDCA+PTX						インターバル
カルボプラチン	AUC	5 <b>~</b> 7	1時間	点静	( Day 1 )	21日
パクリタキセル	175	$mg/m^2$	3時間	点静	( Day 1 )	210
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

卵巣癌 dd TC療法						インターバル
カルボプラチン	AUC	6	1時間	点静	( Day 1 )	21日
パクリタキセル	80	$mg/m^2$	1時間	点静	( Day 1, 8, 15 )	211
【前投薬】なし						

卵巣癌 TC+Bevacizuma	ab					インターバル
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
カルボプラチン	AUC	5 <b>~</b> 7	1時間	点静	( Day 1 )	21日
パクリタキセル	175	mg/ <b>m</b> i̇́	3時間	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタントカプセル(Day1-3)						

卵巣癌 Bevacizumab	maintenance				インターバル
ベバシズマブ	15 mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	21日
【前投薬】なし					

卵巣癌 PTX+BV						インターバル
パクリタキセル	80	mg/ <b>m</b> i̇́	1時間	点静	( Day 1, 8, 15 )	21日
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	214
【前投薬】なし						

卵巣癌 Doxil+CBDCA						インターバル
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	( Day 1 )	28日
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	30	mg∕ <b>m</b> i̇́	90分	点静	( Day 1 )	2011
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)、デカドロン8mg(Da	ny2-3)					

卵巣癌 BV+Doxil+CBDCA						
ベバシズマブ	10	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	( Day 1 )	28日
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	30	mg/ <b>m</b> ²	90分	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)デカドロン8mg(Da	y2-3)					

卵巣癌 Doxil(90mg未満)+BV						インターバル
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	40	mg∕ <b>m</b> ੰ	90分	点静	( Day 1 )	28日
ベバシズマブ	10	mg/kg	30分	点滴	( Day 1, 15 )	2011
【前投薬】なし						

卵巣癌 Doxil(90mg以上)+BV						
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	40	mg/ <b>m</b> i̇́	2時間	点静	( Day 1 )	28日
ベバシズマブ	10	mg/kg	30分	点滴	( Day 1, 15 )	2011
【前投薬】なし						

卵巣癌 Doxil(90mg未満)						インターバル
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	50	mg/ <b>m</b> i̇̃	90分	点静	( Day 1 )	28日
【前投薬】なし	·					

卵巣癌 Doxil(90mg以上)						インターバル
ドキソルビシン(リポソーム注射剤)	50	mg/ <b>m</b> i̇́	2時間	点静	( Day 1 )	28日
【前投薬】なし						

卵巣癌 BV+GEM+CBDC	インターバル					
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
ゲムシタビン	1000	mg/ <b>m</b> i̇̃	30分	点静	( Day 1 )	21日
カルボプラチン	AUC	4	1時間	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3) デカドロン8mg(Day2	2-3)					

卵巣癌 GEM+CBDCA						インターバル
ゲムシタビン	1000	mg/ <b>m</b> i̇́	30分	点静	( Day 1, 8 )	21日
カルボプラチン	AUC	4	1時間	点静	( Day 1 )	2114
【前投薬】なし						

卵巣癌 GEM(★3投1休)						インターバル
ゲムシタビン	1000	mg/ <b>m</b> i̇́	30分	点静	( Day 1, 8, 15 )	28日
【前投薬】なし						

卵巣癌 トポテカン療法						1	ンターバル
ノギテカン	1.5	mg/m²	30分	点静	( Day 1-5)		21日
【前投薬】なし						-	

子宮体癌 CBDCA+PTX						インターバル
カルボプラチン	AUC	6	1時間	点静	( Day 1 )	21日
パクリタキセル	175	${\sf mg/m^2}$	3時間	点静	( Day 1 )	211
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮体癌 Durva+CBDCA+PTX						インターバル
イミフィンジ	1,120	mg/body	1時間	点静	( Day 1 )	
パクリタキセル	175	mg/ <b>m</b> ²	3時間	点静	( Day 1 )	21日
カルボプラチン	AUC	6	1時間	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮体癌 Durvalumab						インターバル
イミフィンジ	1,500	mg	1時間	点静	( Day 1 )	28日
【前投薬】なし						

子宮体癌(pMMR)Durvalumab+Olaparib							
イミフィンジ	1,500	mg	1時間	点静	( Day 1 )	20 🗆	
リムパーザ	600	mg/body	1日2回	経口	連日	- 28日	
【前投薬】なし							

子宮体癌 Pembrolizumab+CBDCA+PTX						インターバル
キイトルーダ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	
パクリタキセル	175	mg∕ <b>m</b> i̇́	3時間	点静	( Day 1 )	21日
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

【3週毎】子宮体癌 Pembrolizumab維持						
キイトルーダ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	21日
【前投薬】なし					•	

【6週毎】子宮体癌 Pembrolizumab維持						インターバル
キイトルーダ	400	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	42日
【前投薬】なし						

【3週毎】子宮体癌 Pen	インターバル				
ペムブロリズマブ	200 mg/body	30分	点静	( Day 1 )	21日
レンバチニブ	20 mg/body	分1	経口	連日	2111
【前投薬】なし					

【6週毎】子宮体癌 Pembrolizumab+Lenvatinib					
ペムブロリズマブ	400 mg/body	30分	点静	( Day 1 )	42日
レンバチニブ	20 mg/body	分1	経口	連日	72 🖂
【前投薬】なし					

子宮体癌 ADR						インターバル
ドキソルビシン	60	mg/ <b>m</b> i̇́	10分	点静	( Day 1 )	21日
【前投薬】なし						

子宮体癌 DTX						インターバル
ドセタキセル	70	mg/ <b>m</b> i̇̃	1時間	点静	( Day 1 )	21日
【前投薬】なし						

子宮体癌【アプレピタン	インターバル								
ドキソルビシン	60	mg/ <b>m</b> i̇́	10分	点静	( Day 1 )	21日			
シスプラチン	50	$mg/m^2$	2時間	点静	( Day 1 )	211			
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)									

子宮頸癌【アプレピタント	インターバル					
シスプラチン	40	mg/ <b>m</b> i̇́	1時間	点静	( Day 1 )	7日
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌 CBDCA+RT						インターバル
カルボプラチン	AUC	2	1時間	点静	( Day 1 )	7日
【前投薬】なし						

子宮頸癌 Pembro+CDI	インターバル							
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	21日		
シスプラチン	40	mg/ <b>m</b> i̇̃	1時間	点静	( Day 1 )	7日		
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)								

子宮頸癌 Pembro+CDDP40+RT(CDDPのみ)						
シスプラチン	40	mg/ <b>m</b> i̇́	1時間	点静	( Day 1 )	7日
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌【アプレピタント	インターバル								
ノギテカン	0.75	mg/m <sup>2</sup>	30分	点静	( Day 1-3 )	21日			
シスプラチン	50	mg∕ <b>m</b> i̇́	2時間	点静	( Day 1 )	214			
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)									

子宮頸癌 CBDCA+PT	インターバル					
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	( Day 1 )	21日
パクリタキセル	175	${\sf mg/m^2}$	3時間	点静	( Day 1 )	214
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌【アプレピタント	インターバル								
パクリタキセル	175	mg/ <b>m</b> i̇́	3時間	点静	( Day 1 )	21日			
シスプラチン	50	${\sf mg/m^2}$	1時間	点静	( Day 1 )	210			
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)									

子宮頸癌【アプレピタン	インターバル					
パクリタキセル	175	mg/ <b>m</b> i̇́	3時間	点静	( Day 1 )	
シスプラチン	40	$mg/m^2$	1時間	点静	( Day 1 )	21日
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌【アプレピタント	インターバル					
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	
パクリタキセル	175	${\sf mg/{\it m}^{\it i}}$	3時間	点静	( Day 1 )	21日
シスプラチン	50	${\sf mg/{\it m}^{\it i}}$	1時間	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌【アプレピタ	インターバル					
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	
パクリタキセル	175	mg/ <b>m</b> ²	3時間	点静	( Day 1 )	21日
シスプラチン	50	mg∕ <b>m</b> i̇́	1時間	点静	( Day 1 )	
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

子宮頸癌【アプレピタント	インターバル					
ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	
パクリタキセル	175	mg∕ <b>m</b> i̇́	3時間	点静	( Day 1 )	21日
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	( Day 1 )	2114
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	
【前投薬】 ・アプレピタント(Day1-3)						

【6週毎】子宮頸癌	Pem	インターバル					
ペンブロリズマブ		400	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	42日
【前投薬】なし							

子宮頸癌	CPT-11	4投2休					インターバル
イリノテカン		125	mg/m <sup>2</sup>	90分	点静	( Day 1, 8, 15, 22 )	42日
【前投薬】 なし							

子宮頸癌 セミプリマブ						インターバル
セミプリマブ	350	mg/body	30分	点静	( Day 1 )	21日
【前投薬】なし						

子宮頸癌 テブダック(60mg未満)					
テブダック	2 mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	21日

## 【前投薬】

・ヒアルロン酸ナトリウム点眼薬0.1%(投与期間中継続)

・フルオロメトロン点眼液0.1%(投与前日~投与3日目まで)

・ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(投与時)

子宮頸癌 テブダック(60mg以上)						インターバル
テブダック	2	mg/kg	30分	点静	( Day 1 )	21日

## 【前投薬】

- ・ヒアルロン酸ナトリウム点眼薬0.1%(投与期間中継続)・フルオロメトロン点眼液0.1%(投与前日~投与3日目まで)・ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(投与時)