肝細胞癌 Atezolizumab+BV(初回)							インターバル
アテゾリズマブ		1,200	mg/body	60分	点静	(Day 1)初回のみ	21日
ベバシズマブ		15	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	2111
【前投薬】 なし							

肝細胞癌 Atezolizumab+BV(2回目以降)							
アテゾリズマブ	1,200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日	
ベバシズマブ	15	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	211	
【前投薬】なし							

肝細胞癌 CDDP-TAI(レジメン)							
動注用シスプラチン	65	mg/m^2		動注	(Day 1)	28日	
【前投薬】なし							

肝細胞癌 CDDP-TAI(HBV用)						
動注用シスプラチン	65	mg/m ²	動注	(Day 1)	28日	
【前投薬】なし						

(肝細胞癌)Durva+Treme							
トレメリムマブ	300	mg/body	60分	点静	(Day 1)	単回	
デュルバルマブ	1,500	mg/body	60分	点静	(Day 1)	28日	
【前投薬】なし							

(肝細胞癌)Durvalumab(4週毎)							
デュルバルマブ	1,500	mg/body	60分	点静	(Day 1)	28日	
【前投薬】なし							

(肝細胞癌)Nivo+Ipi						インターバル
ニボルマブ	80	mg/body	30分	点静	(Day 1)	21日
イピリムマブ	3	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	2111
【前投薬】なし						

(肝細胞癌) Nivo単剤(2週毎)							
ニボルマブ	240	mg/body	30分	点静	(Day 1)	14日	
【前投薬】なし							

(肝細胞癌) Nivo単剤(4週毎)							
ニボルマブ	480	mg/body	30分	点静	(Day 1)	28日	
【前投薬】なし							

(肝細胞癌) Ram単剤						インターバル
ラムシルマブ	8	mg/kg	60分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】なし						

肝細胞癌 Ram単剤(30分)						
ラムシルマブ	8	mg/kg	30分	点静	(Day 1)	14日
【前投薬】なし						

膵癌 mFOLFIRINOX	インターバル							
オキサリプラチン	85	${\rm mg/m}^2$	2時間	点静	(Day 1)			
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日		
イリノテカン	150	mg/m^2	90分	点静	(Day 1)	1711		
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)			
【前投薬】 アプレピタントセット、デキサメタゾン錠 8mg/日(Day 2-3)								

膵癌 FOLFIRINOX						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	
イリノテカン	180	mg/m^2	90分	点静	(Day 1)	14日
フルオロウラシル	400	mg/m^2	5分	点静	(Day 1)	
フルオロウラシル	2,400	mg/m^2	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】 アプレピタントセット、デキサメタゾン錠 8mg	g/日(Day 2-3)					

膵癌 GEM療法(iv)						インターバル
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8,15)	28日
【前投薬】なし						

膵癌 術前GEM+S-1						インターバル		
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8)			
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/ m ੈ/day	1日2回	内服	(Day 1-14)			
	体表面積 -1.25 80 mg/body/日							
			1.25-1.49	100 mg/bod	ly/日			
			1.50-	120 mg/bod	ly/日			
【前投薬】なし								

膵癌 nab−PTX+GEM療法								
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8,15)	28日		
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8,15)	2011		
【前投薬】なし								

膵癌 nal−IRI+5−FU/LV						インターバル
イリノテカン リポソーム製剤	70	${\rm mg/m}^2$	90分	点静	(Day 1)	
レボホリナート	200	mg/m^2	2時間	点静	(Day 1)	14日
フルオロウラシル	2,400	${\rm mg/m}^2$	46時間	持続	(Day 1)	
【前投薬】なし						

胆道Durva+GC						インターバル
デュルバルマブ	1,500	mg/body	60分	点静	(Day 1)	
シスプラチン	25	mg/m^2	500mL/h	点静	(Day 1,8)	21日
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8)	
【前投薬】なし						

胆道Durvalumab(4週毎)						
デュルバルマブ	1,500	mg/body	60分	点静	(Day 1)	28日
【前投薬】なし						

胆道 Pembro+GC						インターバル
ペンブロリズマブ	200	mg/body	30分	点静	(Day 1)	
シスプラチン	25	mg/m^2	500mL/h	点静	(Day 1,8)	21日
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1,8)	214
【前投薬】なし						

胆道 GC						インターバル
シスプラチン	25	${\rm mg/m}^2$	500mL/h	点静	(Day 1,8)	21日
ゲムシタビン	1,000	${\rm mg/m}^2$	30分	点静	(Day 1,8)	2111
【前投薬】なし						

胆道 GC+S-1	インターバル					
シスプラチン	25	mg/m^2	500mL/h	点静	(Day 1)	
ゲムシタビン	1,000	mg/m^2	30分	点静	(Day 1)	
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m²/day		内服	(Day 1-7)	14日
		体表面積	-1.25	80 mg/boo	dy/日	
			1.25-1.49	100 mg/bod	dy/日	
			1.50-	120 mg/bod	dy/日	
【前投薬】なし						

胆道 GEM+S-1						インターバル
ゲムシタビン	1,000	mg/m ²	30分	点静	(Day 1,8)	
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	60	mg/m³/day		内服	(Day 1-14)	
体表面積 -1.25 60 mg/body/日						
			1.25-1.49	80 mg/boo	dy/日	
			1.50-	100 mg/bod	ly/日	
【前投薬】なし						

膵神経内分泌腫瘍 CBD	インターバル							
カルボプラチン	AUC	6	1時間	点静	(Day 1)	21日		
エトポシド	100	mg/m^2	90分	点静	(Day 1-3)	210		
【前投薬】なし								

膵神経内分泌腫瘍 CBD	インターバル									
カルボプラチン	AUC	5	1時間	点静	(Day 1)	21日				
エトポシド	80	mg/m^2	90分	点静	(Day 1-3)	2111				
エトホット Boy mg/m Soy mg/m Clay 1 3 / Line Clay 1 3 / Line										

膵神経内分泌腫瘍 CDDP+ETP										
シスプラチン	80	${\rm mg/m}^2$	1時間	点静	(Day 1)	21日				
エトポシド	100	mg/m^2	1時間	点静	(Day 1-3)	210				
【前投薬】 ・アプレピタントセット										

膵神経内分泌腫瘍 CDDP+CPT										
イリノテカン	60	${\rm mg/m}^2$	90分	点静	(Day 1,8,15)	28日				
シスプラチン	60	mg/m^2	1時間	点静	(Day 1)	201				
【前投薬】 ・アプレピタントセット										

膵神経内分泌腫瘍 CPT単剤						
イリノテカン	60 mg/	m ² 90分	点静	(Day 1,8,15)	28日	
【前投薬】なし						

膵神経内分泌腫瘍	STZ						インターバル
ストレプトゾシン		1,000	mg/m ²	30分	点静	(Day 1)	7日
【前投薬】なし							

膵神経内分泌腫瘍 3	インターバル										
フルオロウラシル	400	42日									
ストレプトゾシン	500	${\rm mg/m}^2$	30分	点静	(Day 1-5)						
【前投薬】 ・アプレピタントセット											

膵神経内分泌腫瘍 STZ+DXR								
ドキソルビシン	50	mg/m^2	10分	点静	(Day 1, 22)	42日		
ストレプトゾシン	500	${\rm mg/m}^2$	30分	点静	(Day 1-5)	4211		

- 【前投薬】 ・アプレピタントセット(day 1) ・デキサメタゾン錠8mg/day(day 23-24)