

対象患者： 胆道がん

根拠文献：ESMO 2018 Congress,6150

レジメン名： GCS

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	3号液 (維持液) 生理食塩液	500 mL 500 mL	点滴静注	3時間	○		
2	硫酸マグネシウム補正液 生理食塩液	8 mEq 50 mL	点滴静注	30分	○		
3	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
4	シスプラチン 生理食塩液	25 mg/m ² 10 mL	点滴静注	1時間	○		
5	ゲムシタビン 生理食塩液	1,000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day8の朝食後まで内服。

- ・ BSA<1.25 : 80 mg/day 分2
- ・ 1.25 ≤ BSA<1.5 : 100 mg/day 分2
- ・ 1.5 ≤ BSA : 120 mg/day 分2