

対象患者： 膵臓がん

根拠文献： Lancet 2016; 387: 545

レジメン名： オニバイド+5FU/LV

1コースの日数： 14日

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-----|---|----|
| | | | | | 1 | ~ | 14 |
| 1 | デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液 | 9.9 mg 0.75 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | |
| 2 | イリノテカン塩酸塩水和物 リポソーム製剤 生理食塩液 | 70 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 1時間30分 | ○ | | |
| 3 | レボホリナート 生理食塩液 | 200 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 2時間 | ○ | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | |
| 5 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2,400 mg/m ² 150 mL | 点滴静注 | 46時間 | ○ | | |

備考：

制吐剤として下記を内服。

・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)

Rp5はインフューザーポンプを使用