

対象患者： 膵臓がん 根拠文献：Cancer Chemother Pharmacol 2018; 81: 1017
 レジメン名： mFOLFIRINOX
 1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン ホスネツピタント	0.75 mg(50 mL) 9.9 mg 235 mg	点滴静注	30分	○		
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
4	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○		
5	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2,400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)

Rp3及びRp4は同時に投与開始

Rp7はインフューザーポンプを使用