

対象患者： 胆道がん

根拠文献：ESMO 2018 Congress,6150

レジメン名： GCS

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	生理食塩液 補正用硫酸マグネシウム液	500 mL 8 mEq(8 mL)	点滴静注	1時間30分	○		
2	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン	0.75 mg(50 mL) 9.9 mg	点滴静注	15分	○		
3	シスプラチン 生理食塩液	25 mg/m ² 10 mL	点滴静注	1時間	○		
4	ゲムシタビン 生理食塩液	1,000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○		
5	3号液(維持液)	500 mL	点滴静注	1時間30分	○		
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day8の朝食後まで内服。

- ・ BSA<1.25：80 mg/day 分2
- ・ 1.25≦BSA<1.5：100 mg/day 分2
- ・ 1.5≦BSA：120 mg/day 分2

Rp1及びRp5はルート側管から投与