

対象患者：胆道がん

根拠文献：Lancet 2023; 401: 1853

レジメン名：Pembro+GC

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	～	8	～	15	～
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○					
2	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	200 mg or 400 mg/body 50 mL	点滴静注	30分	○					
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン	0.75 mg(50 mL) 9.9 mg	点滴静注	15分	○		○			
5	生理食塩液 補正用硫酸マグネシウム液	500 mL 8 mEq(8 mL)	点滴静注	1時間30分	○		○			
6	シスプラチン 生理食塩液	25 mg/m ² 10 mL	点滴静注	1時間	○		○			
7	ゲムシタビン 生理食塩液	1,000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○		○			
8	3号液(維持液)	500 mL	点滴静注	1時間30分	○		○			
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			

備考：

8コース施行後にGEM+Pembro レジメンへ移行

ペムブロリズマブ 400 mg は6週毎に投与

Rp5及びRp8はルート側管から投与