

対象患者：ホジキンリンパ腫 根拠文献： N Engl J Med 2010; 363: 640

レジメン名： ABVD

1コースの日数： 28日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day								
					1	~	8	~	15	~	22	~	
1	ビンブラスチン硫酸塩 生理食塩液	6 mg/m ² (max 10 mg) 20 mL	ワンショット静注	-	○				○				
2	パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○				○				
3	ダカルバジン 生理食塩液	375 mg/m ² 100 mL	点滴静注	10分	○				○				
4	ブレオマイシン塩酸塩 生理食塩液	10 mg/m ² (max 15 mg) 100 mL	点滴静注	30分	○				○				
5	ドキソルピシン塩酸塩 生理食塩液	25 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○				○				
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○				○				

備考：

ダカルバジン投与時は血管痛予防のため遮光する。

また、制吐剤として下記を内服。

・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1及びDay15) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3及びDay16-17)