

対象患者：非ホジキンリンパ腫

根拠文献：N Engl J Med 2002; 346: 235

レジメン名： R-CHOP

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day			
					1	2	～	21
1	リツキシマブ（遺伝子組換え） 生理食塩水	375 mg/m ² 10倍希釈になるよう調製	点滴静注	※患者個々に異なります	○			
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			
3	ビンクリスチン硫酸塩 生理食塩液	1.4 mg/m ² (max 2 mg) 20 mL	ワンショット静注	-		○		
4	グラニセトロン 生理食塩液	1 mg 50 mL	点滴静注	15分		○		
5	ドキシソルビシン塩酸塩 生理食塩液	50 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分		○		
6	シクロホスファミド 生理食塩液	750 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間30分		○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分		○		

備考：

リツキシマブ（遺伝子組換え）投与前に、アセトアミノフェン400 mg/回及び*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩2 mg/回を内服。
Day2からDay6までプレドニゾロン（100 mg/day）を内服する。
リツキシマブ（遺伝子組換え）とCHOPを同一日に投与する等、上記以外の投与スケジュールにてリツキシマブ（遺伝子組換え）とCHOPを投与することもある。