

対象患者：多発性骨髄腫 根拠文献：N Engl J Med 2016; 375: 754

レジメン名：DBd

1コースの日数： 21日（9コース目以降は28日）

1～3コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
					1	~	4	~	8	~	11	~	15	~	21	
1	ボルテゾミブ 生理食塩液	1.3 mg/m ² (投与量÷2.5) mL	皮下注射		○		○		○		○					
2	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg (初回) 1,000 mL (2回目以降) 500mL	点滴静注	※患者個々に 異なります。	○				○					○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○				○					○		

4～8コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day											
					1	~	4	~	8	~	11	~	15	~	21	
1	ボルテゾミブ 生理食塩液	1.3 mg/m ² (投与量÷2.5) mL	皮下注射		○		○		○		○					
2	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg 500 mL	点滴静注	※患者個々に 異なります。	○											
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○											

9コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	28
1	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg 500 mL	点滴静注	※患者個々に 異なります。	○		
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

ダラツムマブ（遺伝子組換え）投与前にアセトアミノフェン 800 mg/回、*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2 mg/回 を内服。
また、デキサメタゾン 20 mg/dayをDay1-2、4-5、8-9、11-12に内服（8コースまで）。