

対象患者：多発性骨髄腫

根拠文献：N Engl J Med 2016; 375: 1319

レジメン名：DLd

1コースの日数： 28日

### 1～2コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
					1	～	8	～	15	～	22	～
1	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg (初回) 1,000 mL (2回目以降) 500mL	点滴静注	※患者個々に異なります。	○		○		○		○	
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○		○	

### 3～6コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
					1	～	8	～	15	～	22	～
1	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg 500 mL	点滴静注	※患者個々に異なります。	○				○			
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○				○			

### 7コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day							
					1	～	8	～	15	～	22	～
1	ダラツムマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	16 mg/kg 500 mL	点滴静注	※患者個々に異なります。	○							
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○							

#### 備考：

レナリドミド 25 mg/dayをDay 1-21に内服。

ダラツズマブ（遺伝子組換え）投与前にアセトアミノフェン 800 mg/回、*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩 2 mg/回を内服。

デキサメタゾンを下記の通り内服。

・1～2コース目：20 mg/dayをDay1-2、8-9、15-16、22-23に内服。

・3～6コース目：Day1-2に20 mg/day、Day8-14のいずれかで40mg/week、Day15-16に20 mg/day、Day22-28のいずれかで40mg/weekを内服。

・7コース目以降：Day1-2に20 mg/day、Day8-14のいずれかで40mg/week、Day15-21のいずれかで40mg/week、Day22-28のいずれかで40mg/weekを内服する。