

対象患者：ホジキンリンパ腫

根拠文献：N Engl J Med. 2018 ; 378 (4) : 331-344.

レジメン名：A+AVD

1コースの日数：28日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	~	15	~	28
1	生理食塩液	10mL	ワンショット静注	-	○		○		
2	ビンブラスチン硫酸塩 生理食塩液	6 mg/m <sup>2</sup> (max 10mg/body) 20 mL	ワンショット静注	-	○		○		
3	生理食塩液	10mL	ワンショット静注	-	○		○		
4	パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		
5	ダカルバジン 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	10分	○		○		
6	ドキシルピシン 生理食塩液	25 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○		○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		
8	ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え) 生理食塩液	1.2 mg/kg (max 120mg/body) 100 mL	点滴静注	30分	○		○		
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		

備考：

ダカルバジン投与時は血管痛予防のため遮光する。

また、制吐剤として下記を内服。

・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1及びDay15)、80 mg/day 分1 (Day2-3及びDay16-17)