

対象患者：非ホジキンリンパ腫

根拠文献： N Engl J Med. 2022;386(4):351-363.

レジメン名： Pola-R-CHP

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	グラニセトン塩酸塩 生理食塩液	1 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	ドキソルビシン 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	シクロホスファミド 生理食塩液	750 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
5	リツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	375 mg/m <sup>2</sup> total 250mLになるように調製	点滴静注	備考欄参照	○		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
7	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) 生理食塩液	1.8 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分 (初回) 30分 (継続)	○		
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：

抗腫瘍効果を目的にプレドニゾン100mg/day をDay1 から Day5 まで内服する。

リツキシマブ投与30分前にアセトアミノフェン400mg/回及びd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg/回を内服。

リツキシマブはDay2以降に変更することがある。また、リツキシマブの初回投与は入院で実施する。

当院におけるリツキシマブの投与速度は下記のとおり。

- ・初回：25mL/hrで開始し、1時間後に100mL/hr、その後200mL/hrに増速。
- ・2回目以降：100mL/hrで開始し、30分後に200mL/hrに増速。