

対象患者：再発又は難治性多発性骨髄腫 根拠文献：Lancet 2020; 396: 186-97

レジメン名：DKd

1コースの日数： 28日

【1サイクル目】

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
					1	2	8	9	15	16	22	~	28	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○	○	○	○	○	○				
2	カルフィルゾミブ	20 mg/m ² (day1,2) 56 mg/m ² (day1,2以降)	点滴静注	30分	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○	○				
4	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	1800 mg	皮下注射	3~5分	○		○		○		○			

【2サイクル目】

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
					1	2	8	9	15	16	22	~	28	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○	○	○	○	○	○				
2	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	30分	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○	○				
4	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	1800 mg	皮下注射	3~5分	○		○		○					

【3~6サイクル目】

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
					1	2	8	9	15	16	22	~	28	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○	○	○	○	○	○				
2	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	30分	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○	○				
4	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	1800 mg	皮下注射	3~5分	○				○					

【7サイクル以降】

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
					1	2	8	9	15	16	22	~	28	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○	○	○	○	○	○				
2	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注	30分	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○	○				
4	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	1800 mg	皮下注射	3~5分	○									

備考：

ダラツムマブ開始60分前にアセトアミノフェン 800 mg、エピナスチン20 mg、モンテルカスト5 mg を内服(モンテルカストは基本的に1サイクル目のみ)。

デキサメタゾン 20 mg/dayをDay1-2、8-9、15-16、40mg/dayをDay22に内服。

* 75歳を超える患者の場合のデキサメタゾンの用量

1コース目：Day1、2、8、15、22に20mg、Day9、16に8mg

2コース目：Day1、8、15、22に20mg

3~6コース目：Day1、15、22に20mg、Day8に12mg、Day9に8mg

7コース目以降：Day1、22に20mg、Day8、15に12mg、Day9、16に8mg