

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： Lancet Oncol 2019; 20: 924

レジメン名： Atezo+CBDCA+nabPTX

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	~	8	~	15	~
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分 (プライミング用)	○		○		○	
2	アテゾリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	1,200 mg/body 250 mL	点滴静注	1時間(初回) 30分(継続)	○					
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○					
5	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100 mg/m <sup>2</sup> (投与量 ÷ 5) mL	点滴静注	30分	○		○		○	
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○	
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250 mL	点滴静注	1時間	○					
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					

備考：

制吐剤として下記内服を検討する。

・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)