

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： Ann Oncol 2007; 18: 317

レジメン名： CDDP+GEM

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
					1	~	8	~	15	~	
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○						
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○						
3	ゲムシタビン 生理食塩液	1,000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○		○				
4	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45分	○						
5	シスプラチン 生理食塩液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○						
6	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○						
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			○				

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)