

対象患者： 非小細胞肺癌 根拠文献： N Engl J Med 2005; 352: 2589
レジメン名： CDDP+VNR25 Ann Oncol 2007; 18: 317
1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day					
					1	～	8	～	15	～
1	補正用硫酸マグネシウム液 補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	8 mEq 10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○					
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○					
3	ビノレルビン酒石酸塩 生理食塩液	25 mg/m ² 20 mL	ワンショット静注	-	○		○			
4	生理食塩液	10 mL	ワンショット静注	-	○		○			
5	マンニトールS注射液®	300 mL	点滴静注	45分	○					
6	シスプラチン 生理食塩液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○					
7	補正用塩化カリウム液 1号液 (開始液)	10 mEq 500mL	点滴静注	1時間	○					

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・ アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1) 、 80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・ デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-4)

放射線療法と併用する場合、1コースを28日とし、ビノレルビン酒石酸塩を20 mg/m²投与する。