

対象患者：EGFR変異陽性非小細胞肺がん
レジメン名称：(Cycle1/Cycle2以降)Ami+Lazertinib(80kg以上)
1コースの日数：28日

根拠文献： N Engl J Med 2024; 391 : 1486 - 98.

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day									
					1	2	～	8	～	15	～	22	～	28
1	デキサメタゾン 生理食塩液	9.9 mg 50 mL	点滴静注	15 分	○	○								
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	30 分	○	○								
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分				○		○		○		
4	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	350 mg/body 243 mL	点滴静注	開始2時間は50mL/h投与、 その後75mL/hに速度変更	○									
5	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1050 mg/body 229 mL	点滴静注	開始2時間は35mL/h投与、 その後50mL/hに速度変更		○								
6	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1400 mg/body 222 mL	点滴静注	65mL/h				○						
7	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1400 mg/body 222 mL	点滴静注	85mL/h						○				
8	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1400 mg/body 222 mL	点滴静注	125mL/h								○		
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○	○		○		○		○		

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day				
					1	～	15	～	28
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5 分	○		○		
2	アミバンタマブ（遺伝子組換え） 生理食塩液	1400 mg/body 222 mL	点滴静注	125mL/h	○		○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15 分	○		○		

備考：

併用薬ラゼルチニブ240mg/day 連日内服
アミバンタマブの投与開始30～60分前に前投薬(アセトアミノフェン1000mgとd-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg)を内服。
1コース目day1、day8、day15は入院で投与。1コース目day22以降より外来運用あり。