

対象患者： 悪性神経膠腫 根拠文献：N Engl J Med 2005; 352: 987

レジメン名： TMZ療法+RT

1コースの日数： 42日（放射線療法後は28日）

放射線療法中

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
					1	2	3	~	14	~	21	~	28	~	35	~	42	
1	テモゾロミド 注射用水	75 mg/m ² 備考参照	点滴静注	1時間30分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	RT	60 Gy/30Fr	脳局所照射		週5日x6週													

放射線療法後

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	~	14	~	21	~	28	
1	グラニセトロン 生理食塩液	1 mg 50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○									
2	テモゾロミド 注射用水	150 mg/m ² 備考参照	点滴静注	1時間30分	○	○	○	○	○									
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○	○	○	○	○									

備考：
 テモゾロミド100 mgを注射用水41 mLで溶解し2.5 mg/mLとする。
 放射線照射時には下記の制吐剤を内服。
 ・グラニセトロン 1 mg/day 分1