

対象患者：乳がん

根拠文献：N Engl J Med .2017 July 23;122

レジメン名称：PER+HER+PTX

1コースの日数：21日

1コース目

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|--------|-----|---|---|---|----|---|
| | | | | | 1 | ~ | 8 | ~ | 15 | ~ |
| 1 | ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液 | 20 mg 6.6 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 2 | dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液 | 10 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 3 | ベルツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液 | 840 mg/body 250 mL | 点滴静注 | 1時間 | ○ | | | | | |
| 4 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液 | 8 mg/kg 250 mL | 点滴静注 | 1時間30分 | ○ | | | | | |
| 5 | パクリタキセル 生理食塩液 | 80 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 1時間 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 6 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |

2コース目以降

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|
| | | | | | 1 | ~ | 8 | ~ | 15 | ~ |
| 1 | ベルツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液 | 420 mg/body 250 mL | 点滴静注 | 30分 | ○ | | | | | |
| 2 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液 | 6 mg/kg 250 mL | 点滴静注 | 30分 | ○ | | | | | |
| 3 | ファモチジン デキサメタゾン 生理食塩液 | 20 mg 6.6 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 4 | dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液 | 10 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 5 | パクリタキセル 5%ブドウ糖液 | 80 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 1時間 | ○ | | ○ | | ○ | |
| 6 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | |

備考：

| |
|-----|
| 備考： |
|-----|