

対象患者：乳がん

根拠文献：Schmid P et al. N Engl J Med 2022; 386: 556-567

レジメン名：(アプレピタント)Pembro+AC

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○		
2	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30分	○		
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	ドキシソルピシン 生理食塩液	60 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	15分	○		
6	シクロホスファミド 生理食塩液	600 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○		
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・アプレピタント125 mg/day 分1 (Day1)、80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・デキサメタゾン 8mg/day 分2 (Day2-4)