

対象患者：乳がん

根拠文献：Schmid P et al. N Engl J Med 2022; 386: 556-567

レジメン名：(アプレピタント)Pembro+PTX+CBDCA(tri)

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day						
					1	~	8	~	15	~	21
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○						
2	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	200 mg/body 50 mL	点滴静注	30分	○						
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○						
4	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	9.9 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分	○						
5	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6 mg 20 mg 50 mL	点滴静注	15分			○		○		
6	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		○		○		
7	グラニセトロン 生理食塩液	1 mg 50 mL	点滴静注	15分	○						
8	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○		○		○		
9	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 5 250 mL	点滴静注	1時間	○						
10	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

- ・アプレピタント 125 mg/day 分1 (Day1)、80 mg/day 分1 (Day2-3)
- ・デキサメタゾン 8mg/day 分2 (Day2-4)