

対象患者：乳がん

根拠文献: N Engl J Med. 2021 Apr 22;384(16):1529-1541

レジメン名：Sacituzumab Govitecan

1コースの日数：21日

| No | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|------|------------------|-----|---|---|----|
| | | | | | 1 | 8 | ~ | 21 |
| 1 | デキサメタゾン ホスネツピタント パロノセトロン | 9.9mg 235mg 0.75mg | 点滴静注 | 30分 | ○ | ○ | | |
| 2 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液 | 5mg 50mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | ○ | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | ○ | | |
| 4 | サシツズマブ ゴビテカン 生理食塩液 | 10mg/kg 250mL | 点滴静注 | 初回：3時間 継続：1時間 | ○ | ○ | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | ○ | | |

備考：

制吐剤として下記を内服

・オランザピン 5 mg/day 分1 (Day1-4、Day8-11)

FN予防としてPEGフィルグラスチム併用