

対象患者： 大腸がん

根拠文献：J Clin Oncol 2012; 30: 3499

レジメン名： Aflibercept+FOLFIRI

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	生理食塩液注 50mL	50 mL	点滴静注	5分	○		
2	アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) 生理食塩液注 50mL	4 mg / kg 50 mL	点滴静注	1時間	○		
3	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
4	レボホリナート 生理食塩液	200 mg / m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○		
5	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	180 mg / m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
6	フルオロウラシル	400 mg / m <sup>2</sup>	ワンショット静注		○		
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2,400 mg / m <sup>2</sup> 150 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)

Rp4及びRp5は同時に投与開始

Rp7はインフューザーポンプを使用