

対象患者： 大腸がん 根拠文献：Lancet Oncol 2015; 16: 499

レジメン名： 外来用RAM+FOLFIRI

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	d/-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	ラムシルマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	8 mg/kg 250 mL	点滴静注	1時間	○		
3	生理食塩液注	50 mL	点滴静注	15分	○		
4	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
5	レボホリナート 生理食塩液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○		
6	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	180 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
7	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	ワンショット静注		○		
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2,400 mg/m <sup>2</sup> 150 mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服。

・デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)

Rp5及びRp6は同時に投与開始

Rp8はインフューザーポンプを使用