

対象患者： 大腸がん 根拠文献：J Clin Oncol 2005; 23: 3706

レジメン名： 外来用sLV5FU2+BV J Clin Oncol 2007; 25: 2691

1コースの日数： 14日

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む)   | 標準的投与量                            | 投与方法     | 投与時間 | Day |   |    |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------|------|-----|---|----|
|     |                           |                                   |          |      | 1   | ~ | 14 |
| 1   | ペバシズマブ (遺伝子組換え)<br>生理食塩液注 | 5 mg/kg<br>50 mL                  | 点滴静注     | 10分  | ○   |   |    |
| 2   | デキサメタゾン<br>生理食塩液注         | 6.6 mg<br>50 mL                   | 点滴静注     | 15分  | ○   |   |    |
| 3   | レボホリナート<br>生理食塩液          | 200 mg/m <sup>2</sup><br>250 mL   | 点滴静注     | 2時間  | ○   |   |    |
| 4   | フルオロウラシル                  | 400 mg/m <sup>2</sup>             | ワンショット静注 |      | ○   |   |    |
| 5   | フルオロウラシル<br>生理食塩液         | 2,400 mg/m <sup>2</sup><br>150 mL | 点滴静注     | 46時間 | ○   |   |    |

備考：

Rp5はインフューザーポンプを使用