

対象患者： 大腸がん 根拠文献：Lancet Oncol 2018; 19: 660

レジメン名： XELIRI+BV J Clin Oncol 2007; 25: 2691

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	ベバシズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液注	7.5 mg/kg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	イリノテカン塩酸塩水和物 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間30分	○		
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と合わせてカペシタビンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服。

なお、当該用法・用量は根拠文献のAXEPT試験における規定に従い設定。

BSA<1.31：1,800 mg/day 分2

1.31≦BSA<1.69：2,400 mg/day 分2

1.69≦BSA<2.07：3,000 mg/day 分2

2.07≦BSA：3,600 mg/day 分2

制吐剤として下記を内服。

デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)