

対象患者： 大腸がん

根拠文献：J Clin Oncol 2008; 26: 2006

レジメン名： XELOX+BV

J Clin Oncol 2007; 25: 2691

1コースの日数： 21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	21
1	ベバシズマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液注	7.5 mg/kg 50 mL	点滴静注	15分	○		
2	デキサメタゾン パロノセトロン塩酸塩 生理食塩液	6.6 mg 0.75 mg 50 mL	点滴静注	15分	○		
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	2時間	○		
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と合わせてカペシタピンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服。

BSA<1.36：2,400 mg/day 分2

1.36≦BSA<1.66：3,000 mg/day 分2

1.66≦BSA<1.96：3,600 mg/day 分2

1.96≦BSA：4,200 mg/day 分2

制吐剤として下記を内服。

デキサメタゾン 8 mg/day 分2 (Day2-3)