

対象患者：大腸がん

根拠文献：BMC Cancer 2015 Oct 14;15:695

レジメン名：bi weeklyCmab+FOLFOX

1コースの日数： 14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	14
1	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl- クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	500mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○		
4	レボホリナート 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間	○		
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間	○		
6	フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット静注		○		
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 150mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分2 (day2-3)

Rp4及びRp5は同時に投与開始

Rp7はインフューザーポンプを使用