

対象患者：胃がん

根拠文献：Lancet Oncol. 2022 Feb;23(2):234-247

レジメン名：SOX+Nivo

1コースの日数：21日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	○		
2	ニボルマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	30分	○		
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
4	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	○		
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：

上記と併せてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服。

BSA < 1.25 : 80mg/day 分2

1.25 ≦ BSA < 1.5 : 100mg/day 分2

1.5 ≦ BSA : 120mg/day 分2

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分1または2 (day2-3)