

対象患者：胃がん

根拠文献：Lancet. 2021 Jul 3;398(10294):27-40

レジメン名：FOLFOX+Nivo

1コースの日数：14日

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	14
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	○		
2	ニボルマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴静注	30分	○		
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
4	デキサメタゾン パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	○		
5	レボホリナート 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間	○		
6	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	2時間	○		
7	フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット静注		○		
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 150mL	点滴静注	46時間	○		

備考：

制吐剤として下記を内服

デキサメタゾン8mg/day 分1または2 (day2-3)

Rp5及びRp6は同時に投与開始

Rp8はインフューザーポンプを使用