

対象患者：頭頸部がん

根拠文献：N Engl J Med. 2006 Feb 9;354(6):567-78

レジメン名：Cmab(RT併用)

1コースの日数：7日

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	400mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	～	7
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	セツキシマブ (遺伝子組換え) 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：放射線併用