

対象患者：頭頸部がん

根拠文献①：Ann Oncol. 2012 Apr;23(4):1016-22

レジメン名：PTX+Cmab

根拠文献②：Oral Oncol. 2013 Feb;49(2):182-5

1コースの日数：7日

根拠文献③：Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Feb;271(2):373-8

根拠文献④：Anticancer Drugs. 2012 Oct;23(9):996-1001

1コース目

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	7
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6mg 20mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	セツキシマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	400mg/m ² 500mL	点滴静注	2時間	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

2コース目以降

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	Day		
					1	~	7
1	デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液	6.6mg 20mg 50mL	点滴静注	15分	○		
2	dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	10mg 50mL	点滴静注	15分	○		
3	セツキシマブ(遺伝子組換え) 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	○		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	○		

備考：

--